

# Epidémie due aux norovirus

(isolement combiné de contact et gouttelettes)

Cette version courte décrit les mesures capitales lors d'une épidémie due aux norovirus dans un EMS.

Source: Direction de la santé du canton de Saint-Gall

## Annonce/Isolément

Annonce des maladies aux patients, personnel	Selon le concept de l'institution
Isolation	Les résidents/patients sont isolés dans la chambre; dans les chambres à plusieurs lits, les mesures sont prises pour tous les patients. Les patients qui ne sont pas malades ne sont pas transférés dans d'autres chambres. S'il n'y a pas de toilettes personnelles dans la chambre, utilisez évent. une chaise percée ou des toilettes spécialement marquées réservées aux malades.
Marquage	Panneau de porte isolement combiné de contact et gouttelettes (rouge/jaune)
Dépôt devant/dans la chambre	Vêtements de protection, désinfectants pour les mains et les surfaces, chiffons de nettoyage, poubelle, corbeille à linge, conteneur à déchets dans la chambre

## Mesures personnelles pour le personnel

Désinfection des mains	Selon les indications pour la désinfection des mains/mesures standard et en quittant les chambres des résidents/patients.
Masque chirurgical	Dans la chambre du résident/patient (le mettre avant d'entrer dans la chambre)
Gants, blouse/manteau de protection	Dans le cas de soins directs, d'exams médicaux ou d'autres mesures impliquant un contact avec le résident/patient Lors du nettoyage de vomi/de la chaise Pour la désinfection des surfaces (personnel de nettoyage)

## Nettoyage/Désinfection

Surfaces/appareils/instruments	Désinfection immédiate des surfaces contaminées Désinfection des objets qui doivent être sortis de la chambre
Nettoyage de la chambre	Quotidiennement: désinfection des surfaces désinfectables, autres surfaces avec des détergents.
Toilettes	Au moins deux fois par jour, désinfection des toilettes des patients, des visiteurs et du personnel.

### Autres mesures

Résidents/patients	Instruction sur l'hygiène des mains, en particulier après une défécation ou des vomissements.
Thérapeutique, diagnostique	Restriction des mesures non urgentes en cas de maladie (par ex. physio/ergo)
Denrées alimentaires	Ne pas laisser traîner des denrées alimentaires non emballées dans la chambre (fruits)
Vaisselle des repas	Eliminer directement dans le chariot-repas
Déchets/linge	Elimination après le nettoyage de la chambre. Pas de système de double sac.
Visiteurs	Informersur la maladie (modération des visites) Masques chirurgicaux (instruction: mettre/porter le masque correctement) Désinfecter les mains en quittant la chambre
Collaborateurs malades	Dispense de travail jusqu'à 24 heures après la fin des symptômes
Affectation du personnel	Selon les possibilités: Séparation dans les soins aux malades et aux non-malades Pas d'échange de personnel entre les services touchés et les services non touchés

### Isolement/mesures

Levée de l'isolement	Après 24 heures d'absence de symptômes (pas de diarrhée/selles glaireuses, vomissements/nausées) Immunosuppression: après 48 heures sans symptômes Levée uniquement en accord avec l'autorité compétente
Nettoyage/désinfection finale	Nettoyer la pièce avec un désinfectant (surfaces qui ne peuvent pas être désinfectées avec un détergent).